

## **DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA INTERVENCIÓN DE CALDWELL-LUC O ANTROSTOMIA MAXILAR**

### **DESCRIPCION DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS**

Usted padece una enfermedad en uno o ambos senos o cavidades que se encuentran a ambos lados de la nariz y alojados en el interior del hueso maxilar.

Esta intervención se practica con anestesia general y consiste en la apertura de este seno a través de una incisión en el interior de la cavidad oral por encima de los dientes superiores, por lo que no quedarán cicatrices visibles. Se realiza para diagnosticar, evaluar y/o tratar una enfermedad localizada en el seno maxilar.

### **EFFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA INTERVENCION**

Los riesgos vitales son poco frecuentes, aunque como en todo acto médico y teniendo en cuenta la necesidad de anestesia general, en todos los casos, pueden producirse. Estos riesgos vitales, tanto intra como postoperatorios, son los propios de cualquier cirugía mayor y están íntimamente relacionados con la edad, el estado general y la patología asociada que el paciente presente.

Los riesgos posibles son:

- Dolor en la mejilla: los primeros días tras la cirugía
- Hemorragia: que puede requerir transfusión sanguínea.
- Infección de la Herida.
- Lesión del nervio infraorbitario, con falta de sensibilidad en los dientes superiores.
- lesión del ojo
- fracaso en la cicatrización de la herida operatoria sobre los dientes superiores
- recurrencia de la enfermedad

Efectos secundarios

- Disminución de la sensibilidad en la mejilla y los dientes superiores: Desaparece al cabo de unas semanas.
- Fístula oro-antral: Orificio que comunica la cavidad oral (la boca) con el seno maxilar.
- Lesión ocular: Aunque es muy rara, puede quedar como secuela una alteración en la movilidad ocular, o disminución en la agudeza.
- No resolución de la enfermedad

Después de la intervención llevará la nariz taponada completamente por lo menos durante un día. En algunas ocasiones se colocan unos plásticos que deberán permanecer más tiempo, es normal notar algunas molestias como sequedad nasal o formación de costras.

### **BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO**

Mejoría de los síntomas, en caso de éxito de la intervención. Obtención de un diagnóstico de certeza.

### **ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS**

Algunas enfermedades en las que se indica esta intervención, pueden ser tratadas con medicamentos. La intervención se propone en caso de fracaso o no-posibilidad del tratamiento.

### **EFFECTOS PREVISIBLES DE LA NO-REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

Si la intervención se ha indicado para obtener un diagnóstico, no tendrá la posibilidad de un tratamiento adecuado. Continuar con los síntomas que ahora padece, con posibilidad de complicaciones oculares, dentarias y de las partes blandas de la cara

### **LIBERTAD DEL PACIENTE PARA CONSIDERAR LA DECISION TOMADA**

La presente información se suministra en la fecha indicada en el documento de consentimiento para permitir al paciente considerar su decisión. El paciente una vez tomada su decisión, es libre de reconsiderar ésta en cualquier momento

### **INFORMACIÓN ADICIONAL**

.....  
.....  
.....